

A close-up photograph of an olive branch with several olives. Some olives are dark purple, indicating they are ripe, while others are green. The leaves are elongated and green. The background is blurred.

# Τοποθέτηση διατροφικών σκευασμάτων και βιοδιεγερτών σε ελαιώνες



An Agricultural  
Sciences Company

# Διαφοροποίηση οφθαλμών- Δημιουργία ανθικών καταβολών (Φεβρουάριος-Μάρτιος)

## Στόχος

- ❖ “Εντολή» σχηματισμού και ανάπτυξης ανθικών καταβολών
- ❖ Ενέργεια και έξοδος από την καταπόνηση του χειμώνα

### Πρόταση

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| ❖ Hi-Phos® | 500 ml     | /100 L νερό |
| +          |            |             |
| ❖ Seamaxx® | 250-300 ml | /100 L νερό |



**50**

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 50)

# Προανθικά, Εμφάνιση ταξιανθίας (μικρό μούρο) (Μάρτιος-Απρίλιος)

## Στόχος

❖ Ενέργεια και προαγωγή άνθησης

### Πρόταση

❖ Hi-Phos® 300-500 ml /100 L νερό

+

❖ Seamaxx® 250-300 ml /100 L νερό

+

❖ Boron 15 100 ml /100 L νερό



**55**

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 53-55)



# Άνθηση : Κρόκιασμα-10% ανοιχτά άνθη (Απρίλιος – Μάιος)

## Στόχος

- ❖ Επιμήκυνση γυρεοσωλήνα και καρπόδεση
- ❖ Αύξηση ετήσιας βλάστησης για μείωση παρενιαυτοφορίας

## Πρόταση

- ❖ BoLa<sup>®</sup> ή Boron 15    100-150 ml/    100 L νερό
- +
- ❖ Seamac<sup>®</sup> Pro            200-250 ml/    100 L νερό

\* σε χρονιές πλούσιας ανθοφορίας η επέμβαση να αποφεύγεται



60

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 60-61)

# Στάδιο πρώτης ανάπτυξης καρπού (Μάιος-Ιούνιος)

## Στόχος

- ❖ Ανάπτυξη καρπιδίου και αποφυγή σχινοκαρπίας
- ❖ Μεγάλωμα νέας βλάστησης και μείωση παρενιαυτοφορίας

## Πρόταση

|                                |            |             |
|--------------------------------|------------|-------------|
| ❖ BoLa <sup>®</sup> ή Boron 15 | 100 ml     | /100 L νερό |
| +                              |            |             |
| ❖ Seamac <sup>®</sup> Pro      | 200-250 ml | /100 L νερό |
| +                              |            |             |
| ❖ Vercal <sup>®</sup>          | 250-300 ml | /100 L νερό |



71

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 69-71)

# Ανάπτυξη καρπού έως σκλήρυνση πυρήνα (Ιούνιος-Ιούλιος)

## Στόχος

- ❖ Αύξηση μεγέθους καρπού

## Πρόταση

- |               |            |             |
|---------------|------------|-------------|
| ❖ Seamac® Pro | 200-250 ml | /100 L νερό |
| +             |            |             |
| ❖ Vercal®     | 250-300 ml | /100 L νερό |



79

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 75-79)


# Απόκτηση τελικού μεγέθους-Συγκομιδή

## Στόχος

- ❖ Σταθεροποίηση και ελαστικοποίηση επιδερμίδας
- ❖ Αντοχή στους χειρισμούς και σε μυκητολογικές προσβολές

## Πρόταση

- ❖ Vercal® 300-400 ml /100 L νερό



81

Στάδιο εφαρμογής (BBCH 79-81)

# Εφαρμογές με μια ματιά

## Θρέψη



50

55

60

65

68

71

79

81

89



## Αβιοτικό στρες